Teoria do Funcional da Densidade: Moléculas e Sólidos – PGF5360 e 4305360

Lucy V. C. Assali

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

Teoria do Funcional da Densidade

Métodos para resolver as equações de KS

- ⇒ Existem vários e diferentes métodos para resolver as equações de KS
 - são classificados de acordo com o conjunto de funções de base em que são desenvolvidos os orbitais de KS
 - e/ou são classificados de acordo com o tipo de aproximação utilizada para descrever o potencial, etc.
- Funções de base mais comuns para se determinar a densidade periódica de um elétron num sólido são as ondas planas
 - ⇒ não são convenientes para descrever as oscilações das funções de onda próximas aos núcleos atômicos:
 - são eliminadas através de métodos de pseudopotenciais
 - são tratadas tomando-se um conjunto misto de funções de base ⇒ métodos *all electrons*
- Funções de base localizadas são utilizadas para se determinar a função de onda de um elétron numa molécula

Panorama da DFT: Equações de KS

Teoria do Funcional da Densidade

Métodos para resolver as equações de KS: Método APW (Augmented Plane Wave - Slater, 1937)

John C. Slater

divisão do espaço cristalino

Região I: esferas não superpostas, de raios R_{MT} , centradas nas posições atômicas $\Rightarrow$ *potencial é considerado esfericamente simétrico*

Região II: região intersticial ou região interatômica $\Rightarrow$ *potencial é suposto constante*

Potencial: aproximação muffin-tin (MT)

- Esferas não superpostas
- Potencial esfericamente simétrico na região atômica
- Potencial constante na região intersticial

Teoria do Funcional da Densidade

Métodos para resolver as equações de KS: Método APW (Augmented Plane Wave - Slater, 1937)

divisão do espaço cristalino

Região I: esferas não superpostas, de raios R_{MT} , centradas nas posições atômicas $\Rightarrow$ *potencial é considerado esfericamente simétrico*

Região II: região intersticial ou região interatômica $\Rightarrow$ *potencial é suposto constante*

Conjunto base:

Região I: $\psi_I(\vec{r}_\alpha) = \sum_{\ell,m} A_{\ell m}^\alpha u_\ell(r_\alpha, \varepsilon_\ell) Y_{\ell m}(\hat{r}_\alpha)$

identifica os átomos $\Rightarrow \vec{r}_\alpha = \vec{r} - \vec{R}_\alpha$ é o vetor radial a partir do centro da esfera α de raio muffin-tin R_α

$u_\ell(r_\alpha, \varepsilon_\ell)$ são as soluções da parte radial da equação de Schrödinger para a energia ε_ℓ , dentro de cada esfera α :

$$\left\{ -\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + V(r) - \varepsilon_\ell \right\} r u_\ell(r) = 0$$

Região II: $\psi_{II}(\vec{k}, \vec{r}) = \Omega^{-1/2} \left[e^{i(\vec{k} + \vec{G}_n) \cdot \vec{r}} \right]$

volume da célula

Teoria do Funcional da Densidade

Parênteses: porque ondas planas seriam a base ideal para escrever a função de onda de um cristal

Estrutura Cristalina:

Estrutura cristalina
com 1 átomo/célula
(base atômica: ●)

$$\bullet \vec{r}_1 = 0 \quad \text{e} \quad \vec{r}' = \ell_1 \vec{a}_1 = \ell_1 a \hat{i}$$

Função de Bloch: periodicidade do cristal

$$\Psi_k(x) = e^{ikx} u(x)$$

fator de fase

onde

$$u(x + a) = u(x)$$

período

função com a periodicidade da rede

Teoria do Funcional da Densidade

Métodos para resolver as equações de KS: Método APW (Augmented Plane Wave - Slater, 1937)

divisão do espaço cristalino

Região I: esferas não superpostas, de raios R_{MT} , centradas nas posições atômicas $\Rightarrow$ potencial é considerado esfericamente simétrico

Região II: região intersticial ou região interatômica $\Rightarrow$ potencial é suposto constante

Conjunto base:

Região I:
$$\psi_I(\vec{r}_\alpha) = \sum_{l,m} A_{lm}^\alpha u_l(r_\alpha, \varepsilon_l) Y_{lm}(\hat{r}_\alpha)$$

unir em R_{MT}

Região II:
$$\psi_{II}(\vec{k}, \vec{r}) = \Omega^{-1/2} \left[e^{i(\vec{k} + \vec{G}_n) \cdot \vec{r}} \right]$$

$\Rightarrow$ cada onda plana definida na região II fica aumentada por funções atômicas dentro de cada esfera MT

$\Rightarrow$ Conjunto base de ondas APW: $\left\{ \Phi_{\vec{k} + \vec{G}, \varepsilon}^{APW}(\vec{r}) \right\}$

Teoria do Funcional da Densidade

Métodos para resolver as equações de KS: Método APW (Augmented Plane Wave - Slater, 1937)

Conjunto de funções de base:

Superposição de APW's, todas com a mesma energia ε :

$$\Psi_{\vec{k}} = \sum_{\vec{G}} C_{\vec{k}} \Phi_{\vec{k}+\vec{G}, \varepsilon}^{\text{APW}}(\vec{r})$$

princípio
variacional

$$\det[\langle \Phi_i | H - \varepsilon | \Phi_j \rangle]$$

Função dependente da energia

Problema de autovalores não linear

John C. Slater

Pesquisa numérica das energias para as quais o determinante é nulo

Computacionalmente muito caro !!!!!