6. Variáveis de Ação e Ângulo

PGF 5005 - Mecânica Clássica

web.if.usp.br/controle

(Referências principais: Percival 1989, Lichtenberg, 1992,)

IFUSP

2022

Importância

- Introduzidas para sistemas integráveis que têm soluções regulares (periódicas e quase-periódicas).

- Relacionadas às constantes de movimento.
- Importante para definir a integrabilidade de um sistema.

- Conveniente para obter as soluções das equações de movimento. Soluções simples nessas variáveis.

Sistemas com Um Grau de Liberdade

$$H(q,p) = p^2/2m + V(q)$$

$$p(q,E) = \pm\,[2m\,(E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

Equação da trajetória, com energia E, no espaço de fase (q, p).

Vamos introduzir novas variáveis canônicas,
de ângulo e ação (θ, *I*) com as propriedades:
No novo espaço de fase (θ, *I*) a trajetória ocorre com
I constante e apenas θ varia.

Equações de movimento

$$\dot{I} = 0 = -\frac{\partial H}{\partial \theta} \qquad \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} = \text{constant}$$

H = H(*I*)

Essas equações podem ser integradas facilmente

$$\dot{I} = 0 = -\frac{\partial H}{\partial \theta} \rightarrow H = H(I) \qquad \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} = \text{constant} = \omega(I)$$

$$I = I_0 \qquad \theta = \omega(I)t + \delta, \qquad \omega(I) = \partial H/\partial I$$

$\Delta\theta = \omega\, \Delta t$

$2\pi = \omega T$

$$\omega(I) = 2\pi/T = \partial H/\partial I$$



No espaço de fase, a trajetória contem uma àrea A constante no tempo.

Podemos introduzir a ação *I* = A e a sua conjugada canônica como um ângulo θ (entre 0 e 2 π)

Trajetórias nos Espaços de fase (q, p) e (θ, *I*)



θ aumenta de 2π em um período T

ω é a frequência

$$\omega(I) = 2\pi/T = \partial H/\partial I$$

Representação Geométrica

Podemos representar as coordenadas de ângulo e ação em um cilindro I : eixo vertical e θ : ângulo polar



Cada trajetória é uma linha circular com *I* constante e periódica em θ

$$q(\theta + 2\pi, I) = q(\theta, I)$$

$$p(\theta + 2\pi, I) = p(\theta, I).$$

Exemplo (Percival 1989)

Dado o potencial: $$V(q) = U \tan^2 \alpha q$$



Espaços de Fase





Ponto de quilíbrio com E = 0

I (E) > O e I = 0 para E = 0

$$V(q) = U \tan^2 \alpha q \qquad p(q, E) = \pm [2m (E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

A ação pode ser calculada por

$$I = \frac{1}{\pi} \int_{q_1}^{q_2} \mathrm{d}q \, [2m (E - U \tan^2 \alpha q)]^{\frac{1}{2}}$$

Sendo q_1 e q_2: $\tan^2 \alpha q_2 = E/U, \quad q_1 = -q_2.$ (E = V)

Fazendo a integral, obtemos

$$\alpha I = [2m (E + U)]^{\frac{1}{2}} - [2m U]^{\frac{1}{2}}$$

Obtenção da Hamiltoniana H(I) e da frequência ω(I)

Fórmula obtida de I = I(E)

$$\alpha I = [2m\,(E + U)]^{\frac{1}{2}} - [2m\,U]^{\frac{1}{2}}$$

H = E

$$\rightarrow \qquad H(\theta, I) = \alpha I\,[\alpha I + 2\,(2mU)^{\frac{1}{2}}]\,/2m$$

Frequência angular

$$\omega = \partial H/\partial I = \alpha[\alpha I + (2mU)^{\frac{1}{2}}]\,/m$$

$$= \alpha[2\,(E + U)/m]^{\frac{1}{2}}.$$

Exemplo

Bola de massa m, velocidade v, em colisões elásticas entre duas paredes separadas pela distância d

Trajetória
no espaço de fase



Cálculo da ação

$$I = \frac{1}{2\pi}\ (\text{area of rectangle}) = \frac{1}{2\pi} \times 2(2mE)^{\frac{1}{2}} \times d$$

$$= d(2mE)^{\frac{1}{2}}/\pi = mvd/\pi,$$

Hamiltoniana $\quad H(I) = E = (\pi I/d)^2/2m$

Essas equações podem ser integradas facilmente

$$\dot{I} = 0 = -\frac{\partial H}{\partial \theta} \rightarrow H = H(I) \qquad \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial I} = \text{constant} = \omega(I)$$

$$I = I_0 \qquad \theta = \omega(I)t + \delta, \qquad \omega(I) = \partial H/\partial I$$

$\Delta\theta = \omega\, \Delta t$

$2\pi = \omega T$

$$\omega(I) = 2\pi/T = \partial H/\partial I$$

Obter as variáveis de ação e ângulo

Um procedimento para obter a ação e ângulo:

Obter a transformação canônica para a função geratriz conhecida S_2

$$p = \frac{\partial S_2}{\partial q}(I, q) \qquad \theta = \frac{\partial S_2}{\partial I}(I, q)$$

Com essas equações, dadas p, q calculamos I, θ

$$(q, p) \rightarrow (\theta, I)$$

Outro Procedimento:

Igualar áreas das trajetórias nos espaços de fase (q, p) e (θ, *I*)



θ aumenta de 2π em um período T

ω é a frequência

$$\omega(I) = 2\pi/T = \partial H/\partial I$$

Hamiltonina nas Variáveis de Ângulo e Ação

$$(q, p) \rightarrow (\theta, I)$$

Transformação canônica
Áreas descritas nos dois espaços de fase são iguais

No espaço de fase (q, p):

$$A(E) = \oint \mathrm{d}q\, p(q, E)$$

$$p(q, E) = \pm\, [2m\,(E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

$$V(q_i) = E, \quad i = 1, 2$$

$$= 2 \int_{q_1}^{q_2} \mathrm{d}q\, [2m(E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

No espaço de fase (θ, *I*):

$$A(E) = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, I = 2\pi I$$





$$I(E) = \frac{1}{\pi} \int_{q_1}^{q_2} \mathrm{d}q \, [2m\,(E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

Invertendo essa equação, obtemos E (I)

A dimensão da ação I é a do momento angular ou da energia x tempo.
O ângulo é sem dimensão

Segundo procedimento para calcular o ângulo

As áreas δA assinaladas entre duas trajetórias, no percurso entre 0 e t, são iguais. Nesse percurso, as coordenadas variam de 0 a q e de 0 a θ.





No plano p x q a área δA é

$$\delta A = \iint_S \mathrm{d}q\,\mathrm{d}p$$

$$= \int_0^q \mathrm{d}q\,[p(q, I + \delta I) - p(q, I)]$$

$$= \delta I \int_0^q \mathrm{d}q\,\frac{\partial p}{\partial I}(q, I) + O(\delta I)^2$$

$$p(q, E) = \pm\,[2m\,(E - V(q))]^{\frac{1}{2}}$$

No plano *I* x θ a área δA é $\delta A = \delta I\,\theta(q, I)$

Igualando as duas expressões de δA
obtemos a fórmula a ser aplicada para calcular θ

$$\theta(q) = \int_0^q \mathrm{d}q \, \frac{\partial}{\partial I} p(q, I)$$

$$= \frac{\partial}{\partial I} \int_0^q \mathrm{d}q \, p(q, I)$$

Variações típicas das variáveis θ e q, para *I* fixa.





Exemplo do cálculo de θ

No potencial de um exemplo anterior $V(q) = U \tan^2 \alpha q$

Pela fórmula vista

$$\theta(q) = \frac{\partial}{\partial I} \int_0^q \mathrm{d}q \, [2m \, (E(I) - U \tan^2 \alpha q)]^{\frac{1}{2}}$$

Integrando, obtem-se as relações entre q e θ:

$$\theta(q) = m \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}I} \int_0^q \mathrm{d}q \, [2m\,(E - U \tan^2 \alpha q)]^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \sin^{-1} \cdot \left[\left(\frac{E+U}{E} \right)^{\frac{1}{2}} \sin \alpha q \right] ,$$

$$q(\theta) = \frac{1}{\alpha} \sin^{-1} \left[\left(\frac{E}{E+U} \right)^{\frac{1}{2}} \sin \theta \right]$$

Por outro lado, $\theta = \omega t + \delta \qquad \omega = \mathrm{d}E/\mathrm{d}I$

Função geradora para as variáveis de ângulo e ação

Transformação canônica $(q, p) \rightarrow (\theta, I)$

Função geradora $S_2(I, q), = \int_0^q \mathrm{d}q\, p(q, I)$

$$p = \frac{\partial S_2}{\partial q}(I, q), \quad \theta = \frac{\partial S_2}{\partial I}(I, q)$$

Relações entre as variáveis (vistas anteriormente)

pois $\theta(q) = \frac{\partial}{\partial I} \int_0^q \mathrm{d}q\, p(q, I)$

Note que

$$\Delta S_2(I) = \oint \mathrm{d}q \, \frac{\partial S_2}{\partial q}$$

$$= \oint \mathrm{d}q \, p = 2\pi I.$$

Outra função geradora $S_1(\theta, q) = S_2(I, q) - \theta I$

$$\theta = \partial S_2 / \partial I$$

$$\Delta S_1 = \Delta S_2 - \Delta(I\theta)$$

$$= \Delta S_2 - I\Delta\theta = 0$$

Função periódica em θ

Encontrar I e θ e as geradoras $S_2(I, q)$ $S_1(\theta, q)$

$$H(q, p) = p^2/2m + \tfrac{1}{2} m\omega^2 q^2$$

$$I = \frac{1}{\pi} \int_{-q_1}^{q_1} \mathrm{d}q \; [2m\,(E - \tfrac{1}{2} m\omega^2 q^2)]^{\frac{1}{2}} \qquad (m\omega^2 q_1^2 = 2E)$$

$$= E/\omega, \qquad H(I) = \omega I \qquad \partial H/\partial I = \omega$$

$$p = [2m\omega I - (m\omega q)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\theta = \int_0^q \mathrm{d}q \left[\frac{m\omega}{2I - m\omega q^2} \right]^{\frac{1}{2}} = \sin^{-1} \left[q \left(\frac{m\omega}{2I} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

or

$$q = \left(\frac{2I}{m\omega} \right)^{\frac{1}{2}} \sin\theta .$$

$$S_2(I, q) = \int_0^q \mathrm{d}q \, (2m\omega I - m^2\omega^2 q^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$= I \sin^{-1} \left[q \left(\frac{m\omega}{2I} \right)^{\frac{1}{2}} \right] + \frac{1}{2} q \, (2Im\omega - m^2\omega^2 q^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$S_1(\theta, q) = \tfrac{1}{2} m\omega q^2 \cot\theta \quad \rightarrow \quad p = \partial S_1 / \partial q = m\omega q \cot\theta$$

$$= (2Im\omega)^{\frac{1}{2}} \cos\theta$$

Dois Graus de Liberdade

$$J_i = \frac{1}{2\pi} \oint p_i \, dq_i \qquad \theta_i = \omega_i t + \beta_i \qquad J_i = J_{0i}$$

$$\Omega_i = 2\pi/T_i$$

Mapeamento do Sistema Hamiltoniano

Sistema Integrável

$$H(J_1, J_2) = E$$

E: cte. de movimento

$$J_1 = J_1^0$$

$$J_2 = J_2^0$$

$$J_1 = J_1^0 + w_1 t$$

$$J_2 = J_2^0 + w_2 t$$

$$a \equiv \frac{w_1}{w_2} \qquad \frac{w_1}{w_2} = \frac{DJ_1/Dt}{DJ_2/Dt} = \frac{DJ_1}{DJ_2}$$

Se $a = \frac{s}{r}$ r,s inteiros (primos)

$\Rightarrow$ órbitas periódicas, s(r) voltas em $q_1(q_2)$

Se $a \neq \frac{s}{r}$

$\Rightarrow$ órbitas quase-periódicas

r = 1



Figure 3.1. Motion of a phase space point for an integrable system with two degrees of freedom. (a) The motion lies on a torus $J_1 = \text{const.}$, $J_2 = \text{const.}$ (b) Illustrating trajectory intersections with a surface of section $\theta_2 = \text{const.}$ after a large number of such intersections.



Figure 3.2.1. For integrable systems, the twist map consists of trajectories that densely fill a circle (irrational winding number w) and discrete, periodic points (rational winding number w). The rate at which a trajectory completes one revolution of the circle depends on the radius. Thus an initial line of points, a, becomes twisted, b, by the map.

Evolução de Y

Twist



Não-*twist*



Como pode ser notado, a evolução para Y é diferente de acordo com o tipo de mapa, *twist* ou não-*twist*, sendo monotonicamente crescente para o primeiro e não-monotônica para o segundo.

Mapas Twist

Mapa de Poincaré: Intersecções das trajetórias no plano J_1 x q_1 (q_2=cte., J_2>0)

Duas intersecções sucesivas $\Rightarrow$

$$Dt = \frac{2p}{w_2} \qquad Dq_1 = w_1 Dt = 2p\, a$$

$a = a(J_1)$ pois, para E=cte., $J_2 = J_2(E, J_1)$

$$J_{n+1} = J_n,$$

$$\theta_{n+1} = \theta_n + 2\pi\alpha(J_{n+1})$$

Mapas (twist e não twist) são conservativos

$$\boldsymbol{J}_{n+1} = \boldsymbol{J}_n,$$

$$\boldsymbol{\theta}_{n+1} = \boldsymbol{\theta}_n + 2\pi\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{J}_{n+1})$$

$$\frac{\partial(J_{n+1}, \theta_{n+1})}{\partial(J_n, \theta_n)} \equiv [\theta_{n+1}, J_{n+1}] = 1$$

Mapa Canônico para Sistema Hamiltoniano

Sistema Quase Integrável

$$H(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{\theta}) = H_0(\boldsymbol{J}) + \epsilon H_1(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{\theta})$$

Amplitude da perturbação $\varepsilon \sim 0$

Mapa de Poincaré: Intersecções das trajetórias no plano J_1 x θ_1 (θ_2 = cte., $J_2 > 0$)

$$J_{n+1} = J_n + \epsilon f(J_{n+1}, \theta_n),$$

$$\theta_{n+1} = \theta_n + 2\pi\alpha(J_{n+1}) + \epsilon g(J_{n+1}, \theta_n)$$

Funções f, g periódicas em θ